



病院名：精神医療センター芹香病院

(1) ヒヤリ・ハット事例事象別内訳

事象	件数	構成比
指示・情報伝達	0	0.0%
薬剤(処方・与薬・調剤・製剤管理)	120	30.3%
注射・点滴	11	2.8%
内服薬	107	27.0%
その他	2	0.5%
輸血	0	0.0%
治療・処置・診察	0	0.0%
手術	0	0.0%
麻酔	0	0.0%
その他治療	0	0.0%
処置	0	0.0%
診察	0	0.0%
医療用具(機器)使用管理	0	0.0%
ドレーン・チューブ類使用・管理	2	0.5%
検査	0	0.0%
療養上の場面	274	69.2%
転倒・転落	90	22.7%
給食・栄養	7	1.8%
その他	177	44.7%
その他	0	0.0%
合計	396	100.0%

(2) 医療事件事象別内訳

事象	件数	構成比
指示・情報伝達	0	0.0%
薬剤(処方・与薬・調剤・製剤管理)	0	0.0%
注射・点滴	0	0.0%
内服薬	0	0.0%
その他	0	0.0%
輸血	0	0.0%
治療・処置・診察	0	0.0%
手術	0	0.0%
麻酔	0	0.0%
その他治療	0	0.0%
処置	0	0.0%
診察	0	0.0%
医療用具(機器)使用管理	0	0.0%
ドレーン・チューブ類使用・管理	0	0.0%
検査	0	0.0%
療養上の場面	4	100.0%
転倒・転落	3	75.0%
給食・栄養	0	0.0%
その他	1	25.0%
その他	0	0.0%
合計	4	100.0%



(3) 医療事件事例及び再発防止策(レベル3b)

概要(上段は事例、下段はその再発防止策)	
レベル 3b	<p>1</p> <p>起床時間前に入院患者が病室出入り口で転倒し、検査により骨折が判明したため、手術が必要になり転院した。</p> <p>-----</p> <p><b>【再発防止策】</b> 患者の個別の生活リズムに着目し、起床時間には観察を強化することとした。</p>
	<p>2</p> <p>患者が病室内で自分の尿に滑り、顔面から転倒したため、処置が必要になり他院へ緊急搬送した。</p> <p>-----</p> <p><b>【再発防止策】</b> 歩行が安定しない患者に対し、夜間の尿失禁対策や下肢の筋力低下防止のために定期的な運動を行うよう促した。</p>
	<p>3</p> <p>患者が散歩中に転倒し、検査により骨折が判明したため、手術が必要になり転院した。</p> <p>-----</p> <p><b>【再発防止策】</b> 散歩コースの危険箇所を調査し、安全対策を検討し散歩コースの変更等を行った。</p>
	<p>4</p> <p>外来患者が、待合室で、処方された薬を過剰に飲み、意識レベルが低下したため、緊急入院し、点滴治療により経過観察を行った。</p> <p>-----</p> <p><b>【再発防止策】</b> 看護師による待合室の見回りを強化徹底した。</p>