



病院名： 神奈川リハビリテーション病院

(1) ヒヤリ・ハット事例事象別内訳

事 象	件数	構成比
指示・情報伝達	38	6.1%
薬剤(処方・与薬・調剤・製剤管理)	193	30.8%
注射・点滴	43	6.9%
内服薬	107	17.1%
その他	43	6.9%
輸血	2	0.3%
治療・処置・診察	50	8.0%
手術	5	0.8%
麻酔	0	0.0%
その他治療	20	3.2%
処置	24	3.8%
診察	1	0.2%
医療用具(機器)使用管理	19	3.0%
ドレーン・チューブ類使用・管理	67	10.7%
検 査	27	4.3%
療養上の場面	228	36.4%
転倒・転落	161	25.7%
給食・栄養	4	0.6%
その他	63	10.1%
その他	2	0.3%
合 計	626	100.0%

(2) 医療事件事象別内訳

事 象	件数	構成比
指示・情報伝達	0	0.0%
薬剤(処方・与薬・調剤・製剤管理)	0	0.0%
注射・点滴	0	0.0%
内服薬	0	0.0%
その他	0	0.0%
輸血	0	0.0%
治療・処置・診察	2	66.7%
手術	1	33.3%
麻酔	0	0.0%
その他治療	1	33.3%
処置	0	0.0%
診察	0	0.0%
医療用具(機器)使用管理	0	0.0%
ドレーン・チューブ類使用・管理	0	0.0%
検 査	0	0.0%
療養上の場面	1	33.3%
転倒・転落	1	33.3%
給食・栄養	0	0.0%
その他	0	0.0%
その他	0	0.0%
合 計	3	100.0%



(3) 医療事故の代表的事例及び再発防止策(レベル3b)

概要(上段は代表的事案、下段はその再発防止策)	
レベル 3b	<p>1</p> <p>リハビリテーション中に、患者の患部から異音がし、検査により骨折が判明したため、手術を行った。</p> <p>-----</p> <p><b>【再発防止策】</b> リハビリ中の骨折リスクについて再検討し、受傷後の経過年数による骨折の危険性等について院内に周知した。</p>
	<p>2</p> <p>患者の骨折に対する処置として、手術を行い患部の固定を行ったが、十分な結果とならなかったため、再手術を行った。</p> <p>-----</p> <p><b>【再発防止策】</b> 術中術後のレントゲン確認だけでなく、術後においても患部の固定状態を確認するよう徹底した。</p>
	<p>3</p> <p>術後1週目の患者が、靴を履こうとしたところ転倒し、検査により骨折が判明し、手術を行った。</p> <p>-----</p> <p><b>【再発防止策】</b> 患者の年齢などの個別性を考慮した観察体制を強化した。</p>